

Wormmiddelen

Groep	Handelsnaam	Werkzame stof	Vorm	Wachttijd	
				Vlees	Melk
<u>1. Benzimidazolen</u>					
	Valbazen 1,9%	albendazol	drench	12 dgn	
	Bovex 2,265%	oxfendazol	drench	21 dgn	
	Panacur 2,5%	fenbendazol	drench	28 dgn	
	Valbazen Boli	albendazol	bolus	12 dgn	
	Panacur Boli	febendazol	bolus	21 dgn	7 dgn
	Rintal Wormkorrels	febantel	korrels	14 dgn	4 dgn
	Flukiver Combi*	mebendazol, closantel**	drench	65 dgn	
<u>2. Imidazothiazolen</u>					
	Endex suspensie*	levamisol, triclabendazol	drench	42 dgn	
	Levacide	levamisol	drench	8 dgn	3 dgn
	Levacide	levamisol	injectie	18 dgn	
<u>3. Macrocyclische Lactonen</u>					
	Oramec	ivermectine	drench	14 dgn	
	Noromectin	ivermectine	drench	14 dgn	
	Cydectin 0,1 %	moxidectine***	drench	14 dgn	5 dgn
	Ivomec	ivermectine	injectie	63 dgn	
	Dectomax	doramectine	injectie	70 dgn	
	Ges-o-mec	ivermectine	injectie	42 dgn	
	Qualimec	ivermectine	injectie	42 dgn	
	Cydectin Triclamox*	Moxidectine***, triclabendazol	drench	31 dgn	
<u>4. Amino Acetonitriël Derivaten (AAD)</u>					
	Zolvix	monepantel	drench	7 dgn	

*) Deze gecombineerde middelen zijn vooral bedoeld voor de bestrijding van leverbot en zijn daarnaast ook werkzaam tegen maagdarmwormen. Gecombineerde middelen worden alleen geadviseerd als bestrijding van maagdarmwormen en leverbot gelijktijdig nodig is volgens de WormenWijzer en de leverbotprognose. Vanwege het verschil in risicomomenten op ziekte zijn enkelvoudige middelen op zich voldoende voor de bestrijding van maagdarmwormen of leverbot. Vermijd elke onnodige behandeling tegen maagdarmwormen of leverbot om het aantal selectierondes te verminderen en de ontwikkeling resistentie te vertragen.

**) Dit middel is vooral bedoeld voor de bestrijding van leverbot die resistent is tegen triclabendazol. Het middel is ook geschikt voor de bestrijding van multiresistente *Haemonchus contortus*, want closantel is ook werkzaam tegen deze wormsoort. Closantel is geen breedspectrummiddel. Als gelijktijdig met *Haemonchus contortus* andere gevaarlijke wormsoorten ziekte kunnen veroorzaken is een gecombineerde behandeling met een middel uit groep 2, 3 of 4 nodig.

***) Een moxidectine-houdend middel heeft een nawerking van enkele weken (circa 4 weken) tegen *Haemonchus contortus* en *Teladorsagia circumcincta*. Bij gebruik van een middel met deze werkzame stof geldt voor het gebruik van de WormenWijzer:

- Daar waar gevraagd wordt naar de datum van de laatste behandeling, je de datum waarop het middel is uitgewerkt kunt nemen in plaats van de feitelijke behandeldatum. Dit kan eenvoudigweg door de laatste daadwerkelijke behandeldatum te verlengen met de nawerkingsperiode.
- Dat je de WormenWijzer pas 4 weken na afloop van de nawerkingsperiode opnieuw hoeft te raadplegen voor een behandeladvies op maat.